



# Booster Impfreihenfolge laut STIKO



Altersgruppe	Grundimmunisierung		Auffrischungsimpfung
	1.Impfung	2.Impfung	3.Impfung
12- bis 29-Jährige	Biontech	Biontech	Biontech
30- bis 59-Jährige	Biontech	Biontech	Biontech
	Moderna	Moderna	Moderna
Über- 60-Jährige	Biontech	Biontech	Biontech
	Moderna	Moderna	Moderna
	AstraZeneca	Biontech	Biontech
	AstraZeneca	Moderna	Moderna
	Johnson&Johnson	Biontech	Biontech
	Johnson&Johnson	Moderna	Moderna
Schwangere jeden Alters	Biontech	Biontech	Biontech
Personen, die einen in der EU nicht zugelassenen Impfstoff erhalten haben	Erneute Impfserie mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff		Biontech (< 30-Jährige) oder Moderna (≥ 30-Jährige)

# Booster-Empfehlung für Genesene laut STIKO



Genesung bzw. Impfung		Weiteres Vorgehen	
1.Ereignis	2.Ereignis	Grundimmunisierung	Auffrischungsimpfung
Corona-Infektion	Eine Impfstoffdosis	Keine weitere Impfstoffdosis zur Grundimmunisierung notwendig	Biontech (< 30-Jährige) oder Moderna (≥ 30-Jährige) im Abstand von in der Regel sechs Monaten zur vorangegangenen Impfung oder zur vorangegangenen Infektion - je nachdem, welches Ereignis zuletzt aufgetreten ist
Corona-Infektion	Zwei Impfstoffdosen		
Eine Impfdosis	Corona-Infektion < vier Wochen nach der Impfung	Impfung	
Eine Impfdosis	Corona-Infektion ≥ vier Wochen nach der Impfung	Keine weitere Impfstoffdosis zur Grundimmunisierung notwendig	
Zwei Impfstoffdosen	Corona-Infektion		